

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

- Fortalecer habilidades de toma de decisiones, resolución de problemas y resistencia a la presión de grupo para enfrentar situaciones relacionadas con drogas.
- Fomentar un ambiente familiar y escolar en el que se pueda hablar abiertamente sobre las drogas sin juicios ni estigmas.
- Incentivar la participación en actividades deportivas, artísticas u otras actividades positivas que promuevan la salud física y mental, reduciendo el tiempo libre para la experimentación con drogas.
- Dirigir los esfuerzos de prevención hacia los adolescentes y jóvenes, quienes son más vulnerables a la experimentación con drogas.
- Proporcionar acceso a servicios de tratamiento y rehabilitación para personas que ya están consumiendo drogas, y apoyar su recuperación a largo plazo.



CENTRO NACIONAL TOXICOLÓGICO

Brinda información adecuada, precisa y actualizada sobre los riesgos, efectos tóxicos y consecuencias de la exposición a las drogas en la salud. Así mismo, disponibilidad de análisis para su identificación y existencia de antídotos en el país.

Los datos de las consultas son confidenciales.

EN CASO DE SOSPECHA DE INTOXICACIÓN

Observa, identifica y actúa



3392-4403
3276-7679



CENTOX HN



centroxfqf@unah.edu.hn




<https://centox.unah.edu.hn>



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

DROGAS DE DISEÑO



FENTANILO

Existen dos tipos de fentanilo, el de uso médico y el fentanilo ilícito.

Fentanilo de uso médico

Es prescrito en pacientes con cáncer terminal para tratar los dolores crónicos o a personas que se realizan operaciones quirúrgicas.

FENTANILO ILÍCITO

Fabricado ilícitamente en laboratorios clandestinos: Suele mezclarse con cocaína, heroína y metanfetamina, genera tolerancia y dependencia física y psíquica convirtiéndose en un producto extremadamente peligroso, para la salud.

EFECTOS A LA SALUD


Somnolencia 

Náuseas y vómito 

Piel fría o húmeda y pegajosa 

Depresión respiratoria 

Presión baja 

Colapso cardiovascular 

Muerte 

PRIMEROS AUXILIOS

Trate de mantener a la persona despierta y respirando.



Quédese con la persona hasta que llegue el personal de asistencia en emergencias.

No brinde nada de comer o de beber a la víctima.



Coloque a la persona de costado para evitar que se asfíxie.



Si comienza a convulsionar no intente sujetarle o introducir algo en la boca, simplemente haga todo lo posible para que no se golpee con los objetos que haya alrededor.

PRESENTACIONES

 **Líquido**

 **Parches**

 **Pastillas**

 **Polvo**

 **gotas**